

● ● ● | Статистика

По статистике в 50% случаев сексуальное насилие над несовершеннолетними совершают знакомые взрослые люди и близкие родственники.

данные протокола Генеральной прокуратуры правительственной КДНиЗП, декабрь, 2022 г.

● ● ● | Что делать в случае подозрений?

- мягко и осторожно поговорить;
- успокоить и подбодрить ребенка, чтобы он понял: вы ни в чём его не обвиняете;
- дать мягкую обратную связь: подчеркнуть, что это могло случиться с каждым;
- оказать моральную поддержку;
- объяснить, что испытывать такие чувства — нормальная реакция психики;
- дать шанс выговориться, не перебивать его и не торопить.
- поделиться с ребенком своими намерениями: обратиться к психологу, социальному педагогу или в правоохранительные органы.

● ● ● | Куда обратиться за помощью?

Телефон доверия для детей, подростков и родителей:
8(800)-2000-122

Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения:
+7 (391) 227-43-78,
+7 (391) 227-16-34,
+7 (391) 227-68-34



Управление образования
Администрации Иланского района

Памятка для родителей

● ● ● | Как распознать насилие?

- Сексуальное насилие
- Физические признаки сексуального насилия
- Изменения в поведении ребёнка
- Изменения в эмоциональном состоянии ребёнка
- Статистика
- Что делать в случае подозрений?
- Куда обратиться за помощью?

• • • | Сексуальное насилие -

- вовлечение зависимых, незрелых в развитии детей и подростков в сексуальную деятельность, которую они не понимают и на которую они не в состоянии дать осознанное согласие, или которая нарушает социальные табу семейных ролей;
- это удовлетворение половой страсти с ребёнком против его желания в условиях, когда ребёнок не в состоянии отказаться от этого и защитить себя вследствие неравенства физических сил.

По отношению к ребенку это любая активность сексуального плана, которая превышает нормы общения с ним.



• • • | Физические признаки сексуального насилия

- порванное, запачканное или окровавленное нижнее бельё;
- гематомы в области половых органов;
- гематомы на груди, ягодицах, нижней части живота, бёдрах;
- боль в животе, головная боль;
- расстройство сна;
- повторяющееся воспаление мочеиспускательных путей;
- венерическая болезнь;

• • • | Изменения в поведении ребёнка

Изменения в выражении сексуальности ребёнка

- чрезмерный интерес к играм сексуального содержания; поразительное для возраста знание о сексуальной жизни;
- соблазняющее поведение по отношению к противоположному полу;
- необычная сексуальная активность: частое раздражение половых органов.

• • • | Изменения в эмоциональном состоянии ребёнка

- замкнутость, подавленность;
- депрессивность, грустное настроение;
- частая задумчивость;
- истерическое поведение, быстрая смена самоконтроля;
- трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними;
- страх перед любыми физическими контактами;
- резкие, беспричинные перемены в отношении конкретного человека или места;
- снижение самооценки; стыд, отвращение, вину, чувство собственной испорченности, недоверие;
- смирение, покорность, отсутствие попыток защитить себя, сопротивления грубости и агрессии в отношении себя;
- мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.

